

präoperativ

Besiedelung mit MRSA

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt
- Saniert

Operationsfeldferne Infektion

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt
- Saniert

Serumalbumin >35 g/l

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Blutglukose < 11 mmol/l

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Hb-Wert ♀/♂ >7,5 />8,7mmol/l

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Unterschrift Chirurg

perioperativ

Perioperative Antibiotika- prophylaxe 30-60 min vor OP

- Trifft zu
- < 30 min
- > 60 min
- Nicht anwendbar/bekannt

Haarentfernung durch Clipping statt Rasur

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Antisept. Spülung kontaminierter Traumata

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Hautantiseptik > 1,5 min auf talgdrüsenarmer bzw. > 3 min auf talgdrüsenreicher Haut

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Double Gloving bei hoher Perforationsgefahr oder Implantateinsatz

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Unterschrift Chirurg

intraoperativ

Normothermie während OP(>36,0°)

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Handschuhwechsel nach ~ 90 min für 1. Operateur + 1. Assistenten

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Handschuhwechsel nach ~ 150 min für 2. Operateur und Op.-Schwester

- Trifft zu
- Trifft nicht zu
- Nicht anwendbar/bekannt

Unterschrift Chirurg