

Publikationen aus TACOS

1. Bischof G, John U. Suchtmittelabhängigkeit bei Männern und Frauen. In: Hurrelmann K, Kolip P. Eds. *Geschlecht, Gesundheit und Krankheit Männer und Frauen im Vergleich*. Bern: Huber; 2002. p. 342 - 358.
2. Bischof G, John U, Meyer C, et al. Zur Versorgungslage von Rauchern und Personen mit riskantem Alkoholkonsum. In: Rumpf H-J, Hüllinghorst R. Eds. *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Freiburg: Lambertus; 2003. p. 45-58.
3. Bischof G, John U, Rumpf H-J. Geschlechtsspezifische Aspekte der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. *Sucht aktuell*. 2003; 10:24-30.
4. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Deutsche Version des Coping-Behaviours Inventar (CBI). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kufner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
5. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Remission ohne formelle Hilfen und Inanspruchnahme stationärer Behandlung bei Alkoholabhängigen: Ein Vergleich auslösender Faktoren. *Sucht*. 2000; 46:54-61.
6. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Gender differences in natural recovery from alcohol dependence. *J Stud Alcohol*. 2000; 61:783-786.
7. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Maintenance factors of recovery from alcohol dependence in treated and untreated individuals. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*. 2000; 24:1773-1777.
8. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Factors influencing remission from alcohol dependence without formal help in a representative population sample. *Addiction*. 2001; 96:1327 - 1336.
9. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Future directions of research on "natural recovery". *Addiction*. 2001; 96:1678 - 1679.
10. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Remission from alcohol dependence without help: How restrictive should our definition of treatment be? *J Stud Alcohol*. 2002; 63:229 - 636.
11. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Aufrechterhaltende Bedingungen von unbehandelten Ausstiegsprozessen aus der Alkoholabhängigkeit. In: Richter G, Rommelspacher H, Spies C. Eds. *Alkohol, Nikotin, Kokain und kein Ende? Lengerich: Pabst; 2002. p. 449 - 456*.
12. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Die Skala zur Erfassung sozialen Drucks. In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kufner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
13. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Types of natural recovery from alcohol dependence: a cluster analytic approach. *Addiction*. 2003; 98:1737-1746.
14. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Stability of subtypes of natural recovery from alcohol dependence after two years: A longitudinal analysis. *Addiction*. 2007; 102:904-908.
15. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Inanspruchnahme medizinischer Versorgung bei Rauchern und riskant Alkohol konsumierenden Personen: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsstudie. *Das Gesundheitswesen*. 2004; 66:114-120.
16. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, et al. What triggers remission without formal help from alcohol dependence? Findings from the TACOS-Study. In: Rosenqvist P, Blomqvist J, Koski-Jännes A, Öjesjö L. Eds. *Addiction and life course*. Helsinki: NAD-publication no 44; 2004. p. 85-101.
17. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Influence of psychiatric comorbidity in alcohol dependent subjects in a representative population survey on treatment utilization and natural recovery. *Addiction*. 2005; 100:405-413.

18. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Gender differences in temptation to drink, self-efficacy to abstain and coping behavior in treated alcohol dependent individuals. *Addiction Research and Theory*. 2005; 13:129-136.
19. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Änderungsmotivation. In: Thomasius R, Küstner UJ. Eds. *Familie und Sucht*. Stuttgart: Schattauer; 2005. p. 123-131.
20. Bott K, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Psychiatrische Lebenszeit-Komorbidität bei Abhängigkeit, Missbrauch und riskantem Konsum von Alkohol in der Allgemeinbevölkerung. In: Richter G, Rommelspacher H, Spies C. Eds. *Alkohol, Nikotin, Kokain und kein Ende?* Lengerich: Pabst; 2002. p. 267 - 274.
21. Bott K, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Psychiatric disorders among at-risk consumers of alcohol in the general population. *J Stud Alcohol*. 2005; 66:246-253.
22. Bott K, Rumpf H-J, Bischof G, et al. Der Alkoholabstinenz-Selbstwirksamkeitsfragebogen: deutsche Version (AASE-G). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES), Version 300*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2003.
23. Freyer J, Schumann A, Rumpf H-J, et al. Deutsche Version der Processes of Change Scale für Alkoholkonsum (POCA-G). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES), Version 300*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2003.
24. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, et al. Prevalence, quality of life and psychosocial function in obsessive-compulsive disorder and subclinical obsessive-compulsive disorder in northern Germany. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences*. 2000; 250:262-268.
25. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, et al. Somatoform pain disorder in the general population. *Psychother Psychosom*. 2003; 72:88-94.
26. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, et al. Specific somatoform disorder in the general population. *Psychosomatics*. 2003; 44:304-311.
27. Hannover W, Meyer C, Michael A, et al. Association of sense of coherence with DSM-IV mental disorders in a general population sample. *Family Medicine & Primary Care Review*. 2007; 9:978-985.
28. Hannover W, Michael A, Meyer C, et al. Die Sense of Coherence Scale von Antonovsky und das Vorliegen einer psychiatrischen Diagnose. *Ergänzungen zu den deutschen Normwerten aus einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe*. *Psychother Psychosom Med Psychol*. 2004; 54:179-186.
29. Hannover W, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Die Skala zur Entscheidungsbalance bei Alkoholkonsum (ADBS-D). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
30. Hannover W, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Alkoholkonsum (RCQ-D). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
31. Hannover W, Thyrian JR, Hapke U, et al. The Readiness to Change Questionnaire in subjects with hazardous alcohol consumption, alcohol misuse and dependence in a general population survey. *Alcohol Alcohol*. 2002; 37:362 - 369.
32. Hannover W, Thyrian JR, Rumpf H-J, et al. Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Rauchern (FÄR). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
33. Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Project 4: Substance use, abuse and dependence among the adult population in a rural and urban region of northern Germany. *Eur Add Res*. 1998; 4:208 - 209.
34. Hapke U, Schumann A, Rumpf H-J, et al. Association of smoking and nicotine dependence with trauma and posttraumatic stress disorder in a general population sample. *J Nerv Ment Dis*. 2005; 193:843-846.

35. Hapke U, Schumann A, Rumpf H-J, et al. Post-traumatic stress disorder: The role of trauma, preexisting psychiatric disorders, and gender. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 2006; 256:299-306.
36. John U. Bevölkerungsbezogene Gesundheitsversorgung bei Alkoholkonsum, - mißbrauch und -abhängigkeit. In: John U, Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren. Eds. *Regionale Suchtkrankenversorgung Konzepte und Kooperationen.* Freiburg: Lambertus; 1997. p. 11-26.
37. John U. Gesundheit und gesundheitliche Versorgung von Alkoholabhängigen. In: Weber I. Eds. *Gesundheit sozialer Randgruppen.* Stuttgart: Enke; 1997. p. 44-56.
38. John U. Epidemiologie. In: Gastpar M, Mann K, Rommelspacher H. Eds. *Lehrbuch der Suchterkrankungen.* Stuttgart: Thieme; 1999. p. 3-14.
39. John U. Analytische Epidemiologie des Substanzmißbrauchs in Deutschland. *Sucht.* 2000; 46:6-8.
40. John U, Hapke U, Rumpf H-J. Gesundheitsversorgung und Sekundärprävention der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. In: Watzl H, Rockstroh B. Eds. *Abhängigkeit und Mißbrauch von Alkohol und Drogen.* Göttingen: Hogrefe; 1997. p. 185-199.
41. John U, Hapke U, Rumpf H-J. Der bevölkerungsbezogene Gesundheitsansatz und Konsum psychotroper Substanzen. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften.* 1998; 6:58-74.
42. John U, Hapke U, Rumpf H-J. A new measure of the alcohol dependence syndrome: the severity scale of alcohol dependence. *Eur Add Res.* 2003; 9:87-93.
43. John U, Hapke U, Rumpf H-J, et al. Prävention von Gesundheitsstörungen aufgrund von Tabakrauchen und Alkoholkonsum - der Beitrag zur Gesundheitsversorgung mit besonderer Berücksichtigung des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. *Sucht.* 2002; 48:284 - 295.
44. John U, Hapke U, Rumpf H-J, et al. Das TTM als Instrument in der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung - der Ansatz der Community Medicine. In: Keller S. Eds. *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis.* Freiburg: Lambertus; 1999. p. 45-55.
45. John U, Hapke U, Rumpf H-J, et al. Entwicklung und Testgüte der Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit. *Sucht.* 2001; 47:414 - 420.
46. John U, Hill A, Rumpf H-J, et al. Alcohol high risk drinking, abuse and dependence among tobacco smoking medical care patients and the general population. *Drug Alcohol Depend.* 2003; 69:189-195.
47. John U, Meyer C, Hapke U, et al. Nicotine dependence and lifetime amount of smoking in a population sample. *Eur J Public Health.* 2004; 14:182-185.
48. John U, Meyer C, Hapke U, et al. Nicotine dependence, quit attempts, and quitting among smokers in a regional population sample from a country with a high prevalence of tobacco smoking. *Prev Med.* 2004; 38:350-358.
49. John U, Meyer C, Hapke U, et al. The Fagerström Test for Nicotine Dependence in two adult population samples - potential influence of lifetime amount of tobacco smoked on the degree of dependence. *Drug Alcohol Depend.* 2003; 71:1-6.
50. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Relation among stage of change, demographic characteristics, smoking history, and nicotine dependence in an adult German population. *Prev Med.* 2003; 37:368-374.
51. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Probabilities of alcohol high-risk drinking, abuse or dependence estimated on grounds of tobacco smoking and nicotine dependence. *Addiction.* 2003; 98:805-814.
52. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Depressive disorders are related with nicotine dependence in the population but do not necessarily hamper smoking cessation. *J Clin Psychiatry.* 2004; 65:169-176.
53. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Self-efficacy to refrain from smoking predicted by major depression and nicotine dependence. *Addict Behav.* 2004; 29:857-866.

54. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Smoking, nicotine dependence and psychiatric comorbidity - a population-based study including smoking cessation after three years. *Drug Alcohol Depend.* 2004; 76:287-295.
55. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Relationships of psychiatric disorders with overweight and obesity in an adult general population sample. *Obes Res.* 2005; 13:101-109.
56. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Relationships of psychiatric disorders with sleep duration in an adult general population sample. *J Psychiatr Res.* 2005; 39:577-583.
57. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Psychiatric comorbidity including nicotine dependence among individuals with eating disorders criteria in an adult general population sample. *Psychiatry Res.* 2006; 141:71-79.
58. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Nicotine dependence criteria and nicotine withdrawal symptoms in relation to pain among an adult general population sample. *European Journal of Pain.* 2009; 13:82-88.
59. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Predictors of increased body mass index following cessation of smoking. *Am J Addict.* 2006; 15:192-197.
60. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Self-rated general health and psychiatric disorders in a general population sample. *European Psychiatry.* 2005; 20:223-228.
61. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. No considerable long-term weight gain after smoking cessation: evidence from a prospective study. *Eur J Cancer Prev.* 2005; 14:289-295.
62. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Consistency or change in nicotine dependence according to the Fagerström Test for Nicotine Dependence over three years in a population sample. *J Addict Dis.* 2005; 24:85-100.
63. John U, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Strength of the relationship between tobacco smoking, nicotine dependence and the severity of alcohol dependence syndrome criteria in a population-based sample. *Alcohol Alcohol.* 2003; 38:606-612.
64. John U, Meyer C, Schumann A, et al. A short form of the Fagerström Test for Nicotine Dependence and the Heaviness of Smoking Index in two adult population samples. *Addict Behav.* 2004; 29:1207-1212.
65. John U, Riedel J, Rumpf H-J, et al. Associations of perceived work strain with nicotine dependence in a community sample. *Occup Environ Med.* 2006; 63:207-211.
66. John U, Rumpf H-J, Hanke M, et al. Estimation of tobacco- or alcohol-attributable disease rates in national hospital care: an approach based on routine inpatient disease register data and systematic diagnosis of alcohol use disorders. *Alcohol Alcohol.* 2003; 38:339-346.
67. John U, Rumpf HJ, Bischof G, et al. Excess mortality of alcohol-dependent individuals after 14 years and mortality predictors based on treatment participation and severity of alcohol dependence *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 2013; 37:156-163.
68. Kelbsch J, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Epidemiologie und motivationale Aspekte des Rauchens von Light-Zigaretten. In: Richter G, Rommelspacher H, Spies C. Eds. *Alkohol, Nikotin, Kokain und kein Ende?* Lengerich: Pabst; 2002. p. 275 - 282.
69. Kelbsch J, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Stages of change and other factors in 'light' cigarette smokers. *Eur J Public Health.* 2005; 15:146-151.
70. Lencer R, Steinlechner S, Stahlberg J, et al. Primary focal dystonia: evidence for distinct neuropsychiatric and personality profiles. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2009; 80:1176-1179.
71. Lucht M, Schaub RT, Meyer C, et al. Gender differences in unipolar depression: a general population survey of adults between age 18 to 64 of German nationality. *J Affect Disord.* 2003; 77:203-211.
72. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Prevalence of alcohol consumption, abuse and dependence in a country with high per capita consumption: findings from the German TACOS study. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2000; 35:539-547.

73. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung: Ergebnisse der TACOS-Studie. *Nervenarzt*. 2000; 71:535-542.
74. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Regionale Unterschiede in der Prävalenz riskanten Alkoholkonsums: Sekundäranalyse des Gesundheitssurvey Ost-West. *Das Gesundheitswesen*. 1998; 60:486-492.
75. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Einflußgrößen der Änderungsmotivation bei Rauchern und Personen mit riskantem Alkoholkonsum in der Allgemeinbevölkerung: Das "Transitions in Alcohol Consumption and Smoking" (TACOS) Projekt. In: Keller S. Eds. *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Freiburg: Lambertus; 1999. p. 93-102.
76. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Standardized instruments in epidemiological field surveys of psychiatric disorders. In: Mueller U, Heller G. Eds. *Working paper series (Vol 1, pp 16-26)*. Marburg: Medical Centre for Methodology and Health Research, University of Marburg; 1999.
77. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. The Composite International Diagnostic Interview: feasibility and necessity of editing and interviewer training in general population surveys. *Int J Methods Psychiatr Res*. 2000; 9:32-42.
78. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Inanspruchnahme von Hilfen zur Erlangung der Nikotin-Abstinenz. *Sucht*. 2000; 46:398-407.
79. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Prevalence of DSM-IV psychiatric disorders including nicotine dependence in the general population: results from the northern German TACOS study. *Neur Psych Brain Res*. 2001; 9:75 - 80.
80. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Impact of psychiatric disorders in the general population: satisfaction with life and the influence of comorbidity and disorder duration. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2004; 39:435 - 441.
81. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, et al. Subtyping general population smokers not intending to quit by stages to reduce smoking. *Nicotine Tob Res*. 2004; 6:1043-1050.
82. Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, et al. Intentionally reduced smoking among untreated general population smokers: prevalence, stability, prediction of smoking behaviour change and differences between subjects choosing either reduction or abstinence. *Addiction*. 2003; 98:1101-1110.
83. Michael A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Gründe für die Nichtinanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen (GNSH). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
84. Otto C, Bischof G, Rumpf H-J, et al. Multiple dimensions of health locus of control in a representative population sample: ordinal factor analysis and cross-validation of an existing three and a new four factor model. *BMC Medical Research Methodology*. 2011; 11:114.
85. Pané-Farré CA, Fenske K, Stender JP, et al. Sub-threshold panic attacks and agoraphobic avoidance increase comorbidity of mental disorders: Results from an adult general population sample. *J Anxiety Disord*. 2013; 27:485-493.
86. Pané-Farré CA, Stender JP, Fenske K, et al. The phenomenology of first panic attack in clinical and community-based samples. *J Anxiety Disord*. 2014; 28:522-529.
87. Riedel J, Hapke U, Rumpf H-J, et al. Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommenen Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum: Ergebnisse der TACOS-Bevölkerungsstudie. *Gesundheitswesen*. 2002; 64:153-158.
88. Riedel J, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Die Normative und Subjektive Arbeitsanalyse (NUSA): Psychometrische Eigenschaften in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*. 2005; 49:131-139.
89. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, et al. Studies on natural recovery from alcohol dependence: Sample selection bias by media solicitation? *Addiction*. 2000; 95:765-775.

90. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, et al. Ausstiegsprozesse. In: Thomasius R, Küstner UJ. Eds. Familie und Sucht. Stuttgart: Schattauer; 2005. p. 116-122.
91. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, et al. Stability of remission from alcohol dependence without formal help. *Alcohol Alcohol*. 2006; 41:311-314.
92. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, et al. Remission ohne formelle Hilfe bei Alkoholabhängigkeit: Der Stand der Forschung. *Sucht*. 2009; 55:75-85.
93. Rumpf H-J, Bischof G, John U. Remission without formal help: new directions in current research. In: Klingemann H, Carter Sobell L. Eds. Promoting self-change from addictive behaviors. New York: Springer; 2007. p. 73-85.
94. Rumpf H-J, Bischof G, Meyer C, et al. The role of family and partnership in recovery from alcohol dependence: comparison of individuals remitting with and without formal help. *Eur Add Res*. 2002; 8:122 -127.
95. Rumpf H-J, Bischof G, Meyer C, et al. Forschung zur Remission von substanzbezogenen Störungen ohne formelle Hilfe im deutschsprachigen Raum. In: Klingemann H, Sobell L. Eds. Selbstheilung von der Sucht. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften; 2006. p. 101-113.
96. The role of family and partnership in natural recovery from alcohol dependence [<http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>]. (accessed
97. Rumpf H-J, Hapke U, Dawedait A, et al. Project 5: Triggering and maintenance factors of remitting from alcohol dependence without formal help. *Eur Add Res*. 1998;4:209 - 210.
98. Rumpf H-J, Hapke U, John U. Screening-Diagnostik von alkoholbezogenen Störungen: Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST). *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*. 2002; 4:237-241.
99. Rumpf H-J, Hapke U, John U. Deutsche Versionen der verschiedenen Formen des Michigan Alcoholism Screening Test (MAST, SMAST, BMAST). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
100. Rumpf H-J, Hapke U, John U. Deutsche Version des CAGE Fragebogens. In: Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Eds. Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
101. Rumpf H-J, Hapke U, John U: Die Trauma-Skala. In: Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200. Edited by Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
102. Rumpf H-J, Hapke U, John U: Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST). In: Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200. Edited by Glöckner-Rist A, Rist F, Kürfner H. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
103. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, et al. Motivation to change drinking behavior: Comparison of alcohol dependent individuals in a general hospital and a general population sample. *Gen Hosp Psychiatry*. 1999; 21:348-353.
104. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, et al. Motivationale Grundlagen für die Sekundärprävention in unterschiedlichen Populationen. In: Keller S. Eds. Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis. Freiburg: Lambertus; 1999. p. 57-65.
105. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, et al. Epidemiologie. In: Stimmer F. Eds. Suchtlexikon. München: Oldenbourg; 2000. p. 199-203.
106. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, et al. Screening for alcohol use disorders and at-risk drinking in the general population: psychometric properties of three questionnaires. *Alcohol Alcohol*. 2002; 37:261 - 268.

107. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, et al. Inanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen von Alkoholabhängigen und -mißbrauchern: Ergebnisse der TACOS-Bevölkerungsstudie. *Sucht*. 2000; 46:9-17.
108. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, et al. Stadien der Änderungsbereitschaft bei Rauchern in der Allgemeinbevölkerung. *Das Gesundheitswesen*. 1998; 60:592-597.
109. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, et al. Screening for mental health in the general population: validity of the MHI-5 using DSM-IV axis I psychiatric disorders as gold standard. *Psychiatry Res*. 2001; 105:243 - 253.
110. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, et al. Deutsche Version des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
111. Schumann A, Hapke U, John U. Die Berücksichtigung des Transtheoretischen Modells in deutschsprachigen Selbsthilfemanualen zur Raucherentwöhnung. In: Keller S. Eds. *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Freiburg: Lambertus; 1999. p. 119-127.
112. Schumann A, Hapke U, Meyer C, et al. Measuring Sense of Coherence with only three items: A useful tool for population surveys. *British Journal of Health Psychology*. 2003; 8:409-421.
113. Schumann A, Hapke U, Meyer C, et al. Prevalence, characteristics, associated mental disorders and predictors of DSM-IV nicotine dependence. *Eur Add Res*. 2004; 10:29-34.
114. Schumann A, Hapke U, Rumpf H-J, et al. Gesundheitsverhalten von Rauchern - Ergebnisse der TACOS-Studie. *Das Gesundheitswesen*. 2000; 62:275-281.
115. Schumann A, Hapke U, Rumpf H-J, et al. The association between degree of nicotine dependence and other health behaviors. *Eur J Public Health*. 2001; 11:450 - 452.
116. Schumann A, Kohlmann T, Rumpf H-J, et al. Longitudinal relationships among transtheoretical model constructs for smokers in the precontemplation and contemplation stage of change. *Ann Behav Med*. 2005; 30:12-20.
117. Schumann A, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Stage of change transitions and processes of change, decisional balance, and self-efficacy in smokers: a transtheoretical model validation using longitudinal data. *Psychology of Addictive Behaviors*. 2005; 19:3-9.
118. Schumann A, Meyer C, Rumpf H-J, et al. Naturalistic changes in the readiness to quit tobacco smoking in a German general population sample. *Prev Med*. 2002; 35:326 - 333.
119. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Deutsche Version des Fagerström-Test for Nicotine Dependence (FTND) (FTND-d) und des Heaviness of Smoking Index (HSI) (HSI-d). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
120. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Deutsche Version des Processes of Change-Fragebogens für Raucher (POC-R). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
121. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Deutsche Version des Self-Efficacy-Fragebogens für Raucher (SE-R). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
122. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Deutsche Version des Decisional Balance-Fragebogens für Raucher (DB-R). In: Glöckner-Rist A, Rist F, Küfner H. Eds. *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES) Version 200*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen; 2002.
123. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Skalen zu Kernkonstrukten des Transtheoretischen Modells (TTM) im Verhaltensbereich Tabakkonsum. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*. 2003; 11:57-66.

124. Thyrian JR, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Verhaltensspezifische Determinanten der Veränderungsmotivation bei multiplen Risikoverhalten. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie. 2004; 12:56-64.
125. Thyrian JR, Rumpf H-J, Meyer C, et al. Comparison of a population-based sample of "risky drinking" smokers and groups consuming just one substance. Subst Use Misuse. 2005; 40:1721-1732.
126. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, et al. Die Prozesse der Verhaltensänderung im Kontext des Lebensalters am Beispiel des Tabakrauchens. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie. 2004; 12:39-47.